

# Embarazo Tubárico y Tratamiento con Methotrexate

(Tubal Pregnancy and Methotrexate Treatment)




IH-I-114S  
R.D. 1/05  
Pág 1 de 2

## Qué es embarazo ectópico?

Un embarazo normal se desarrolla en el útero de la mujer. Si un embarazo empieza en el ovario, cérvix o cualquier otro lugar dentro del estómago (abdomen), se le llama embarazo ectópico.

El lugar más común para el comienzo de un embarazo ectópico son las Trompas de Falopio. A esto se le llama embarazo tubárico. El embarazo en una trompa puede reventar la trompa y causar problemas como sangrado dentro de su cuerpo. Esto puede poner su vida en peligro.



## Cómo puedo saber si tengo un embarazo tubárico?

Las mujeres con embarazo tubárico pueden no tener síntomas de 6 a 8 semanas.

Los síntomas comunes son:

- Cambios en su período menstrual
- Un poquito de sangrado vaginal color oscuro
- Nada de período menstrual cada mes
- Dolor de espalda
- Sentirse enfermo del estómago (náusea)
- Dolor de estómago (abdomen) que puede ser:
  - con calambres o dolor muy fuerte
  - constante, que va y viene
  - en un lado o en todo el estómago (abdomen)



## Cómo tratarán mi embarazo tubárico?

Un embarazo tubárico debe terminarse porque es un peligro para usted. Su proveedor de salud pedirá exámenes de sangre y un ultrasonido vaginal es muy importante para ayudarlo a decidir si le hacen tratamiento con Methotrexate o si necesita cirugía.

## Tratamiento con Methotrexate

Methotrexate (MTX) es una medicina que se usa para tratar ciertos tipos de cáncer y también para terminar el embarazo tubárico. Se le dará en pequeñas cantidades que son seguras. Se le pondrá una inyección de esta medicina.

(continúa)

## Qué efectos secundarios comunes puedo tener después de este tratamiento?

- Sentirse enferma del estómago (náusea)
- Vómito
- Puede sentir leve malestar de estómago (abdomen) de 5 a 10 después de la inyección

## Qué cosas especiales necesito saber?

- Necesita regresar a la clínica varias veces a hacerse exámenes de sangre y revisar la inyección. Esto es para asegurarse que la medicina funcionó. Algunas mujeres necesitan una segunda inyección de Methotrexate para terminar el embarazo tubárico.
- Pregúntele a su proveedor de salud cuando puede:
  - Tomar alcohol.
  - Tomar vitaminas
  - Tener sexo
- Dígale a su proveedor de salud si tiene:
  - más dolor en el estómago (abdomen)
  - sangrado fuerte de su vagina
- Use algún método anticonceptivo para no quedar en embarazo por 3 meses después del tratamiento. Hable con su proveedor de salud para ver cuál es el mejor para usted.
- Mantenga en casa una copia de los papeles del tratamiento con Methotrexate. Tráigalos a su próxima consulta.

### Llame al 911 y venga a la sala de emergencia por:



- dolor de estómago agudo y repentino
- dificultad para respirar
- suda demasiado
- dificultad para orinar
- siente que se desmaya
- dolor en el hombro

