

# Después de Su Broncoscopia, Laringoscopia o Panendoscopia



IH-III-10S  
R.D. 6/07  
Pág. 1 de 1

(After Your Bronchoscopy, Laryngoscopy or Panendoscopy)

- **No maneje hasta el día siguiente de la broncoscopia.**
- Puede sentirse con sueño las próximas 24 horas, así que hoy no maneje ni firme ningún documento importante o legal. Descanse los próximos 2 días y no haga ningún trabajo pesado, ejercicio o actividades.
- No coma o tome nada hasta 2 horas después de la prueba. La medicina que el doctor puso en su nariz y garganta tiene un efecto entumecedor. Si trata de comer o tomar algo antes de que se le quite este efecto, el alimento o líquido puede irse a sus pulmones. El resto del primer día solo tome líquido y coma alimentos suaves. Al día siguiente puede comer lo que acostumbra.
- Puede tener la garganta o el oído adolorido hasta por una semana. Puede usar acetaminofen (Tylenol) pero **no use Aspirina** para este dolor. Use el acetaminofen (Tylenol) como lo indica la botella.
- Por 1 ó 2 días usted podrá ver poquitos de sangre en la saliva.
- **Su profesional de salud le dará los resultados de su prueba en su cita de seguimiento.**

**Llame a la Línea de Enfermeras al 214-266-8777  
o venga a la Sala de Emergencia si:**



- De repente le falta la respiración y no ha hecho ejercicio
- Tiene dolor de garganta por más de una semana
- Ve poquitos de sangre en la saliva por más de tres días
- Tiene fiebre sobre 100.5 F (38° C) por más de 24 horas después de la prueba.

