

# Advertencias Abdominales

## (Abdominal Warnings)


Servicio de Emergency



IH-IV-131  
R.D. 11/00  
Página 1 de 1

### Qué Hacer:

1. Quédese en la casa y descanse durante 24 horas o más tiempo si el doctor se lo dice.
2. Tome solamente líquidos transparentes tales como: jugo de manzana, caldo, o sodas (gaseosas) durante las primeras 24 horas.
3. Pregunte a su doctor antes de tomar las medicinas que tenga en su casa.
4. Tome las medicinas que su doctor le recete.
5. No falte a su cita en la clínica.



### Vigile estos Síntomas de Peligro:

- Empieza a vomitar o sentirse más mal.
- Vomita sangre o ve sangre cuando hace del baño.
- Cuando hace del baño (defeca) es rojo o negro.
- Siente dolor en el lado derecho del abdomen (estómago).
- El dolor no mejora en 24 horas.
- El dolor empeora.
- Su abdomen (estómago) se inflama.
- Siente mareo o se desmaya.
- Siente dificultad para respirar.
- Su temperatura está sobre 101° F (38.3° C).



**Venga a la Clínica de Cuidado Ambulatorio (ACC) o a la Sala de Emergencia si tiene alguno de estos síntomas de peligro**