

Después de Su Cirugía del Ojo

(After Your Eye Surgery)



IH-IV-194S
W. D. 7/06
Pág. 1 de 2

Esto es lo que debe hacer después de la **primer semana**, de haber tenido la cirugía del ojo:




- Lávese las manos antes de ponerse gotas en los ojos.
- Ponga 1 (una) gota de Prednisolone Acetate 1% (medicina que se ve lechosa) en su ojo **4** veces al día.
- Ponga 1 (una) gota de Vigamox en su ojo **4** veces al día.
- Mantenga el protector para cubrirse el ojo.
- No levante nada pesado. No se incline hacia adelante.
- No haga esfuerzo para ir al baño (heces).
- Regrese a su cita en la clínica.
- Traiga todas sus medicinas (gotas de ojos, también).
- **Antes de irse de la clínica** asegúrese de tener la fecha y hora de su cita de seguimiento para dentro de **1 semana**.



En cualquier momento después de la cirugía del ojo, vaya a la Sala de Emergencia o llame a la clínica al 214-590-5593 (8 am a 4 pm) si tiene:



- Fiebre sobre 101° Fahrenheit (38.3° Celsius) o más
- Mucho dolor en su ojo
- Cambio en la visión (en lo que ve)
- Sangre o cualquier otro líquido que salga de su ojo
- Más enrojecimiento e inflamación de su ojo
- Dolor de cabeza con náusea (sentirse mal del estómago) o con vómito.



(continúa)

La **segunda semana** después de la cirugía del ojo:


- Lávese las manos antes de ponerse gotas en los ojos. Ponga 1 (una) gota de Prednisolone Acetate 1% (la medicina que se ve lechosa) en sus ojos **3** veces al día.
- Ponga 1 (una) gota de Vigamox en su ojo **4** veces al día hasta que la medicina se termine.
- Durante el día use anteojos para el sol o anteojos. Mantenga el protector puesto en la noche.
- No levante nada pesado. No se incline hacia adelante.
- No haga esfuerzo para ir al baño (heces).



Llame al 214-590-5499 para verificar la fecha y hora de su **cita de seguimiento a las 4 semanas** después de su cirugía.

Asegúrese de mantener la cita.

Traiga todas sus medicinas (gotas de ojos, también).



La **tercera semana** después de su cirugía del ojo:

- Lávese las manos antes de ponerse gotas en los ojos. Ponga 1 (una) gota de Prednisolone Acetate 1% (la medicina que se ve lechosa) en sus ojos **2** veces al día.



La **cuarta semana** después de su cirugía del ojo:

- Lávese las manos antes de ponerse gotas en los ojos. Ponga 1 (una) gota de Prednisolone Acetate 1% (la medicina lechosa) en sus ojos **1** vez al día.

