

# Después de Que Le Saquen Un Diente (After Having A Tooth Pulled)



IH-IV-30S  
R.D. 4/07  
Pág. 1 de 1

## Qué esperar:

1. **Sangrado:** Usted sangrará un poco después de que le haya sacado sus dientes. Muerda sobre la gasa para detener la sangre. Use gasa nueva cuando la necesite.
  - Si el sangrado no se detiene después de 4 horas, llame al (214) 590-5606
2. **Dolor:** Tome su medicina para el dolor como le indique su doctor o enfermera.
3. **Inflamación:** Usted puede tener inflamación. Si la tiene, use aplicaciones de hielo por 24 horas. Después de 2 horas, use aplicaciones tibias.



## Qué hacer:

- Coma alimentos suaves las primeras 24 horas después de la cirugía.
- Tome bastante agua y jugo después de la cirugía.

- **No** se enjuague la boca el día de la cirugía.
- **No** escupa.
- **No** tome con popote (pajilla) por 48 horas.
- **No** fume entre 24 y 48 horas después de la cirugía.
- **No** tome alcohol mientras toma medicina para el dolor.
- **No** tome soda o bebidas carbonadas (con espuma) durante 48 horas.

**Llame a la línea de enfermeras al (214) 266-8777 si tiene preguntas o inquietudes.**