

Su Medicina



IH-V-101S
R..D/ 3/03
Pág. 1 de 2

Divalproex Sodium (Depakote)

Acido Valpróico (Depakene)

Por qué necesito esta medicina?

- Esta medicina ayuda a controlar los ataques. Ayuda a controlar la ausencia, lo mioclónico, ataques parciales y convulsivos.
- También sirve para ayudar a balancear el humor a personas que sufren de esto.

Cómo tomo esta medicina?

- Es posible que su doctor quiera que tome la medicina en tableta o en líquido.
- Tome la medicina como le dijo el doctor. **No deje de tomar** divalproex o ácido valproico hasta que el doctor le diga que no lo tome más.
- Tome esta medicina con alimento o con leche. Con esto puede evitar que se le revuelva el estómago. **No** las mastique ni las parta a la mitad.
- Si toma la medicina líquida, asegúrese de usar la medida correcta. Las cucharas de la cocina no son del mismo tamaño y puede recibir la cantidad incorrecta de divalproex o ácido valpróico.
- **Que no se le olvide ninguna dosis de la medicina.** Si se le olvida una dosis tómela lo más pronto posible. Si ya es casi hora para su próxima dosis, no tome la dosis que se le olvidó y regrese a su horario normal. No tome dos dosis al mismo tiempo.

Cuáles efectos secundarios puedo tener?

El tener efectos secundarios no quiere decir que es alérgico a la medicina. Los efectos secundarios por lo general mejoran en pocos días. Si no es así, debe decirle al doctor. El doctor puede hacer unos cambios en su medicina. No deje de tomar la medicina a menos que su doctor se lo diga.

(continúa)

- Puede sentir hambre. Si come más de lo normal puede aumentar de peso.
- Puede tener temblor en las manos.

Llame a su doctor si:

- tiene una erupción (enrojecimiento, comezón en la piel)
- tiene dolor de estómago
- se siente más cansado de lo normal
- tiene la orina café oscura
- su piel se pone amarilla

Qué cosas especiales debo saber?

1. **Alerta!** Si toma anticoagulantes o tiene problemas de sangrado, dígame a su doctor. Divalproex o ácido valpróico pueden empeorar el sangrado. **No** tome otras medicinas sin hablar con su doctor.
2. Dígame a su doctor si tiene **alergia a alguna medicina.**
3. Asegúrese de **mantener todas sus citas** al doctor y exámenes de sangre.
4. **No tome** alcohol mientras toma esta medicina. La cerveza, el vino o licor fuerte puede hacer que se sienta más mareado o con más sueño. El tomar alcohol puede causarle ataque si está tomando divalproex o ácido valpróico para controlarlos.
5. **No** comparta la medicina con nadie.
6. Mantenga toda la medicina fuera del alcance de los niños. Solo una pequeña cantidad de esta medicina puede enfermar a un niño o hasta causarle la muerte. Mantenga todas las medicinas en un lugar seguro donde los niños no puedan alcanzarlas.
7. Esta medicina puede cambiar la forma como funcionan las pastillas anticonceptivas. Si no quiere quedar en embarazo, hable con su doctor sobre estos métodos para no quedar embarazada.
8. Si está embarazada, planea un embarazo o dar pecho hable con su doctor **antes** de tomar la medicina. **Esta medicina puede tener efectos muy dañinos para los bebés sin nacer.** Si no está tomando anticonceptivos asegúrese de decirle a su doctor.