

Su medicina



IH-V-105 S
R.D. 3/03
Pág. 1 de 2

Haldol (Haloperidol) **Prolixin (Fluphenazine)**

¿Por qué necesito esta medicina?

Esta medicina ayuda a las personas a controlar su propio pensamiento, concentrarse mejor, y sentirse tranquilos. También ayuda con problemas como el oír voces y ver cosas. Ninguna de estas medicinas causa adicción.

¿Cómo tomo esta medicina?

- Tome esta medicina exactamente como le diga su doctor. No deje de tomar la medicina aunque se empiece a sentir mejor.
- Prolixin D es una inyección que dura cerca de dos semanas. Empezará a funcionar en dos días más o menos. Es especialmente útil para las personas que no les gusta tomar tabletas.
- Haldol D es como Prolixin D pero dura hasta un mes. Puede ser que usted reciba una inyección una o dos veces al mes, en vez de estarse preocupando de tomar tabletas todos los días.

¿Cuáles efectos secundarios comunes puedo tener?

- Estas medicinas pueden hacerlo sentir mareado, con sueño, rígido, o inquieto. **No tome alcohol** cuando esté tomando estas medicinas, porque el mareo y adormecimiento pueden empeorar.
- **Precaución:** Hable con su doctor antes de manejar o de hacer trabajos o actividades donde necesite estar alerta.
- Puede tener espasmos musculares. Estos son espantosos, pero no peligrosos. La mayoría de las veces el cuello y la lengua se afectan. Hay medicinas que ayudarán a detener los espasmos musculares. Si usted tiene espasmos musculares graves, vaya a la sala de emergencia.

(continúa)

¿Cuáles cosas especiales necesito saber?

1. Dígale a su doctor si es **alérgico a alguna medicina**.
2. Esta medicina causará que se queme con el sol mucho más fácilmente. Permanezca lejos del sol lo más posible. Póngase protector del sol y use camisas de manga larga y un sombrero si va estar afuera.
3. Fácilmente puede ocurrir agotamiento por el calor. Sea **muy** cuidadoso de no calentarse demasiado.
4. Mantenga todas las medicinas fuera del alcance de los niños. Hasta una pequeña cantidad de esta medicina puede enfermar a un niño o hasta causarle la muerte. Mantenga todas las medicinas en un lugar seguro donde los niños no puedan alcanzarlas.
5. **No** comparta su medicina con nadie.
6. Si usted está embarazada, planea embarazarse, o está dando pecho, dígale a su doctor antes de tomar esta medicina. **Esta medicina puede tener efectos dañinos en los bebés sin nacer**. Si no está usando ningún anticonceptivo, asegúrese de decirle a su doctor.
7. Asegúrese de **no faltar a sus citas** para consultar al doctor y para exámenes de sangre.
8. Todas las medicinas pueden causar efectos secundarios. Normalmente, estos efectos secundarios mejorarán después de unos cuantos días. Si no es así, debe decirle a su doctor. El doctor puede hacer algunos cambios en la medicina. **No** deje de tomar la medicina a menos que su doctor le diga. Los efectos secundarios **no** quieren decir que sea alérgico a la medicina.