

Su medicina

Trazodone (Desyrel)



IH-V-126 S
R.D. 3/03
Pág. 1 de 2

¿Por qué necesito esta medicina?

Trazodone es un antidepresivo que se usa para depresión. Trazodone ayuda a mejorar la depresión:

- mejorando su humor.
- mejorando su habilidad para disfrutar la vida otra vez.
- mejorando su nivel de energía.

¿Cómo tomo esta medicina?

- Tome esta medicina cuantas veces le diga el doctor. La mayoría de las personas empiezan a sentirse mejor en casi 10 días, pero algunas veces se toma de 2 a 4 semanas para que la medicina funcione.
- No deje de tomar la medicina a menos que su doctor le diga.
- Si se le pasa una dosis, tómela tan pronto como sea posible. Si ya es casi la hora para su próxima dosis, no tome la dosis que se le pasó y regrese a su horario normal. **No tome dos dosis al mismo tiempo.**
- Tome trazodone con alimento para disminuir los efectos del mareo.

¿Cuáles efectos secundarios comunes puedo tener?

- Visión borrosa
- Mareo o adormecimiento
- Nerviosismo
- Estreñimiento
- Boca reseca
- Náusea

Normalmente estos efectos secundarios mejorarán en unos cuantos días. Si los efectos secundarios **no** mejoran, hable con su doctor.

¿Cuáles cosas especiales necesito saber?

- **No** deje de tomar trazodone sin hablar con su doctor. Recuerde, puede tomar de 2 a 4 semanas antes de empezar a sentirse a mejor.
- Pregunte a su doctor o farmacéutico **antes** de tomar cualquier medicina (como medicina para resfriado o para sinusitis) que pueda comprar sin receta.
- Dígale a su doctor si es **alérgico a alguna medicina.**
- **No** comparta esta medicina con nadie.
- **No** deje de tomar esta medicina de repente.

(continúa)

- Dígale a su doctor si toma alguna medicina recetada o sin recetar, especialmente:
 - inhibidores MAO (phenelzine, Nardil)
 - isocarboxazid (Marplan)
 - tranylcypromine (Parnate)
 - tabletas para dolor o para dormir
 - antidepresivos
- Esta medicina puede causar que le dé sueño o mareo. Vea cómo se siente después de la primer dosis. Si tiene sueño o mareo levántese despacio después de haber estado sentado o acostado. Si tiene sueño o mareo, **no** maneje o haga otros trabajos donde necesite estar alerta.
- **No** tome alcohol mientras está tomando esta medicina. Cerveza, vino o licor fuerte pueden hacer que se sienta más mareado y con más sueño.
- Puede tener la boca reseca cuando toma esta medicina. Dulces duros sin azúcar o goma de mascar puede ayudar a sentirse mejor. Un buen cuidado de sus dientes y encías (cepillando y usando hilo dental) también ayudará a que su boca se sienta mejor.
- Mantenga todas las medicinas fuera del alcance de los niños. Hasta una pequeña cantidad de esta medicina puede enfermar a un niño o hasta causarle la muerte. Mantenga todas las medicinas en un lugar seguro donde los niños no puedan alcanzarlas.
- Si está embarazada, planea embarazarse, o está dando pecho, dígale a su doctor **antes** de tomar esta medicina. **Esta medicina puede tener efectos dañinos en los bebés sin nacer.** Si no está usando ningún anticonceptivo, asegúrese de decirle a su doctor.
- Asegúrese de **no faltar a sus citas** para consultar al doctor y para exámenes de sangre.
- Todas las medicinas pueden causar efectos secundarios. Normalmente, estos efectos secundarios mejorarán después de unos cuantos días. Si no es así, debe decirle a su doctor. El doctor puede hacer algunos cambios en la medicina. **No** deje de tomar la medicina a menos que su doctor le diga. Los efectos secundarios **no** quieren decir que sea alérgico a la medicina.

Llame a su doctor si tiene:

- | | |
|--|-----------------------------|
| • dolor de garganta | • fiebre |
| • hemorragia anormal | • fuerte dolor de cabeza |
| • moretones anormales | • latido rápido del corazón |
| • sangre en su orina | • problemas para orinar |
| • erecciones dolorosas del pene que no se quitan | |