

# Su medicina



IH-V-131 S  
R.D. 3/03  
Pág. 1 de 2

## Buspirone Hydrochloride (Buspar)

### ¿Por qué necesito esta medicina?

Buspirone se usa para ayudar a tratar la ansiedad.

### ¿Cómo tomo esta medicina?

- Tome esta medicina como le dijo el doctor. Tome buspirone a la misma hora todos los días.
- Si se le pasa una dosis tómela tan pronto como sea posible. Si ya casi es hora para su próxima dosis, no tome la dosis que se le pasó y regrese a su horario normal. **No tome dos dosis al mismo tiempo.**
- Toma de 1 a 2 semanas antes de que pueda ver la diferencia en la manera como se siente.
- Si tiene problemas para quedarse dormido tome su última dosis de buspirone a las 5:00 p.m.
- Tome esta medicina con alimento o leche. Esto puede evitar que se le revuelva el estómago.

### ¿Cuáles efectos secundarios comunes puedo tener?

- Sentir sueño
- Sentirse mareado
- Nerviosismo
- Dolor de cabeza
- Náusea

### ¿Cuáles cosas especiales necesito saber?

- Esta medicina puede causar que le dé sueño o mareo. Vea como se siente después de la primer dosis. Si tiene sueño o mareo levántese despacio después de haber estado sentado o acostado. Si tiene sueño o mareo, **no** maneje o haga otros trabajos donde necesite estar alerta.
- **No** deje de tomar esta medicina sin hablar con su doctor. A algunas personas puede tomarles de 1 a 2 semanas para que se sientan mejor.
- No tome ninguna otra medicina sin hablar con su doctor. Esto incluye la medicina que compra en la tienda sin receta.

(continúa)

- Dígale a su doctor si toma alguna medicina recetada o sin recetar, especialmente:
  - inhibidores MAO (phenelzine, Nardil)
  - isocarboxazid (Marplan)
  - tranylcypromine (Parnate)
  - tabletas para dolor o para dormir
  - antidepresivos
- **No** tome alcohol mientras está tomando esta medicina. Cerveza, vino o licor fuerte pueden hacer que se sienta más mareado y con más sueño.
- Puede tener la boca reseca cuando toma esta medicina. Dulces duros sin azúcar o goma de mascar puede ayudarle a sentirse mejor. Un buen cuidado de sus dientes y encías (cepillando y usando hilo dental) también ayudará a que su boca se sienta mejor.
- **No** comparta esta medicina con nadie.
- Mantenga todas las medicinas fuera del alcance de los niños. Hasta una pequeña cantidad de esta medicina puede enfermar a un niño o hasta causarle la muerte. Mantenga todas las medicinas en un lugar seguro donde los niños no puedan alcanzarlas.
- Si está embarazada, planea embarazarse, o está dando pecho, dígale a su doctor **antes** de tomar esta medicina. **Esta medicina puede tener efectos dañinos en los bebés sin nacer.** Si no está usando ningún anticonceptivo, asegúrese de decirle a su doctor.
- Asegúrese de **no faltar a sus citas** para consultar al doctor y para exámenes de sangre.
- Dígale a su doctor si es **alérgico a alguna medicina.**
- Todas las medicinas pueden causar efectos secundarios. Normalmente, estos efectos secundarios mejorarán después de unos cuantos días. Si no es así, debe decirle a su doctor. El doctor puede hacer algunos cambios en la medicina. **No** deje de tomar la medicina a menos que su doctor le diga. Los efectos secundarios **no** quieren decir que sea alérgico a la medicina.

### **Llame a su doctor si tiene:**

- |                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| • Dolor de garganta | • Dolor de cabeza muy fuerte |
| • Fiebre            | • Latido rápido del corazón  |
| • Ataques           | • Problemas para orinar      |
| • Náusea o vómito   | • Visión borrosa             |