

Su medicina



IH-V-132 S
R.D. 3/03
Pág. 1 de 2

Fluoxetine Hydrochloride (Prozac)

¿Por qué necesito esta medicina?

Fluoxetine se usa para tratar la depresión grave. Fluoxetine le ayudará a mejorar su depresión de la siguiente forma:

- mejorando su humor
- mejorando su nivel de energía
- mejorando su capacidad de disfrutar las cosas

¿Cómo tomo esta medicina?

- Tome esta medicina como le dijo su doctor.
- Tome fluoxetine a la misma hora todas las mañanas. Si se la toma en la tarde puede mantenerlo despierto en la noche.
- Algunas personas pueden tardarse de 2 a 4 semanas para observar alguna diferencia en la manera como se sienten después de empezar fluoxetine.

¿Cuáles efectos secundarios comunes puedo tener?

- | | | |
|-------------------|-----------------|---------------------|
| • Dolor de cabeza | • Sueño | • Cansancio |
| • Nerviosismo | • Temblores | • Erupción |
| • Insomnio | • Mareo | • Estómago revuelto |
| • Sudar mucho | • Bajar de peso | |

¿Cuáles cosas especiales necesito saber?

- **No** deje de tomar fluoxetine sin hablar antes con su doctor. Podrían pasar de 2 a 4 semanas para que algunas personas se sientan mejor.
- No tome alguna otra medicina antes de hablar con su doctor. Esto incluye la medicina que compra en la tienda sin receta.
- **No** comparta esta medicina con nadie.
- Dígale a su doctor si es **alérgico a alguna medicina**.

(continúa)

- Dígale a su doctor si toma alguna medicina recetada o sin recetar, por ejemplo:
 - inhibidores MAO (phenelzine)
 - isocarboxazid (Marplan)
 - tranilcypromine (Parnate)
 - tabletas par dolor o para dormir
 - antidepresivos
- Esta medicina puede causar que le de sueño o mareo. Vea como se siente después de la primera dosis. Si tiene sueño o mareo levántese despacio después de haber estado sentado o acostado. Si tiene sueño o mareo, **no** maneje ni haga otros trabajos donde necesite estar alerta.
- **No** tome alcohol mientras está tomando esta medicina a menos que su doctor se lo permita. Cerveza, vino o licor fuerte pueden hacer que se sienta más mareado y con más sueño.
- Puede tener la boca reseca cuando tome esta medicina. Dulces duros sin azúcar o goma de mascar puede ayudarle a sentirse mejor. Un buen cuidado de sus dientes y encías (cepillando y usando hilo dental) también ayudará a que su boca se sienta mejor.
- Mantenga todas las medicinas fuera del alcance de los niños. Hasta una pequeña cantidad de esta medicina puede enfermar a un niño o hasta causarle la muerte. Mantenga todas las medicinas en un lugar seguro donde los niños no puedan alcanzarlas.
- Si está embarazada, planea embarazarse, o está dando pecho, dígale a su doctor **antes** de tomar esta medicina. **Esta medicina puede tener efectos dañinos en los bebés sin nacer.** Si no está usando ningún anticonceptivo, asegúrese de decirle a su doctor.
- Asegúrese de **no faltar a sus citas** para consultar al doctor y para exámenes de sangre.
- Todas las medicinas pueden causar efectos secundarios. Normalmente, estos efectos secundarios mejorarán después de unos cuantos días. Si no es así, debe decirle a su doctor. El doctor puede hacer algunos cambios en la medicina. **No** deje de tomar la medicina a menos que su doctor le diga. Los efectos secundarios **no** quieren decir que sea alérgico a la medicina.

Llame a su doctor si usted:

- tiene pensamientos de lastimarse usted mismo o a otras personas
- tiene una erupción o urticaria
- tiene dolor de garganta o fiebre
- tiene sangrado o moretones anormales
- tiene latido muy rápido del corazón
- tiene problemas para orinar
- tiene un dolor de cabeza muy fuerte