

Su medicina

Paroxetine (Paxil)



IH-V-133 S
R.D. 3/03
Pág. 1 de 2

¿Por qué necesito esta medicina?

Paroxetine se usa para tratar depresiones graves y ansiedad. Ayuda a mejorar la depresión:

- mejorando su humor
- mejorando su habilidad para disfrutar la vida otra vez
- mejorando su nivel de energía

Algunas veces pueden pasar de 2 a 4 semanas antes de empezar a sentirse mejor.

¿Cómo tomo esta medicina?

- Tome esta medicina exactamente como le dijo el doctor
- Tome esta medicina a la misma hora todos los días
- Si se le pasa una dosis tómela tan pronto como sea posible. Si ya casi es hora para su próxima dosis, no tome la dosis que se le pasó y regrese a su horario normal. Vea su horario al respaldo.

¿Cuáles efectos secundarios comunes puedo tener?

- Dolor de cabeza
- Problemas para dormir
- Náusea
- Temblores
- Mareo
- Excrementos sueltos frecuentes
- Boca reseca
- Estómago revuelto
- Sudor

¿Cuáles cosas especiales necesito saber?

- **No** deje de tomar paroxetine (Paxil) sin hablar con su doctor. Recuerde, pueden pasar hasta 4 semanas antes de empezar a sentirse mejor.
- Pregunte a su doctor o farmacéutico **antes** de tomar cualquier medicina (como medicina para el resfriado o sinusitis) que puede comprar sin receta.
- **Antes** de tomar esta medicina, dígame a su doctor acerca de cualquier medicina que haya tomado en las 2 semanas anteriores.

(continúa)

- Esta medicina puede causar que le dé sueño o mareo. Vea cómo se siente después de la primer dosis. Si tiene sueño o mareo levántese despacio después de haber estado sentado o acostado. Si tiene sueño o mareo, **no** maneje o haga otros trabajos donde necesite estar alerta.
- **No** tome alcohol mientras está tomando esta medicina. Cerveza, vino o licor fuerte pueden hacer que se sienta más mareado y con más sueño.
- Puede tener la boca reseca cuando tome esta medicina. Dulces duros sin azúcar o goma de mascar pueden ayudarle a sentirse mejor. Un buen cuidado de sus dientes y encías (cepillando y usando hilo dental) también ayudará a que su boca se sienta mejor.
- Mantenga todas las medicinas fuera del alcance de los niños. Hasta una pequeña cantidad de esta medicina puede enfermar a un niño o hasta causarle la muerte. Mantenga todas las medicinas en un lugar seguro donde los niños no puedan alcanzarlas.
- Si está embarazada, planea embarazarse, o está dando pecho, dígame a su doctor **antes** de tomar esta medicina. **Esta medicina puede tener efectos dañinos en los bebés sin nacer.** Si no está usando ningún anticonceptivo, asegúrese de decirle a su doctor.
- **No comparta** esta medicina con nadie.
- Asegúrese de **no faltar a sus citas** para consultar al doctor y para exámenes de sangre.
- Dígame a su doctor si es **alérgico a alguna medicina.**
- Todas las medicinas pueden causar efectos secundarios. Normalmente, estos efectos secundarios mejorarán después de unos cuantos días. Si no es así, debe decirle a su doctor. El doctor puede hacer algunos cambios en la medicina. **No** deje de tomar la medicina a menos que su doctor le diga. Los efectos secundarios **no** quieren decir que sea alérgico a la medicina.

Mis Instrucciones Especiales

Llame a su doctor si tiene alguna pregunta.