

Su medicina



Phenytoin (Dilantin)

¿Porqué necesito ésta medicina?

Phenytoin ayuda a **controlar las convulsiones** o ataques. Su doctor posiblemente quiera que la tome en cápsula, en tableta o en líquido.

¿Cómo tomo ésta medicina?

1. Tome ésta medicina exactamente cómo le ordenó su doctor. **No deje** de tomar phenytoin a menos que su doctor le diga.
2. Tome ésta medicina con alimento o leche. Esto puede evitar que se le revuelva el estómago.
3. Si la está tomando en líquido, **agite bien la botella** antes de usarla. Esté seguro de usar la cuchara correcta. Las cucharas de la cocina podrían no ser iguales y usted no recibiría la cantidad correcta de medicina.

¿Cuáles efectos secundarios más comunes puedo tener?

1. Esta medicina puede causar que le dé sueño o mareo. **Estos efectos normalmente se quitan mientras más toma la medicina.** Vea cómo se siente después de la primera dosis. Si tiene sueño o mareo, levántese despacio después de haber estado sentado o acostado. Si tiene sueño o mareo, no maneje o haga otros trabajos donde necesite estar alerta.
2. Tomando phenytoin puede hacer sus encías suaves e inflamadas. Usted puede ayudar a mantener sus encías saludables **cuidando muy bien su boca**, cepillando sus dientes después de comer con un cepillo de dientes de cerdas suaves y cuidadosamente frotar sus encías con el cepillo de dientes.

¿Cuáles cosas especiales necesito saber?

1. Nunca deje de **repente** de tomar phenytoin a menos que su doctor le diga. Dejando de repente el phenytoin puede causar que tenga ataques.

(voltee la hoja)

2. **No tome** alcohol mientras está tomando ésta medicina. Cerveza, vino o licor fuerte pueden hacer que se sienta más mareado y con más sueño. Tomar alcohol puede causar que tenga ataques.

Llame a su doctor si usted:

- **tiene una erupción (ronchas rojas)**
- se siente mareado o con sueño
- se siente diferente de lo normal
- tiene problema para caminar
- tiene visión doble

3. **Diabéticos:** esta medicina puede hacer que se eleve su azúcar en la sangre. Hable con su doctor si su azúcar en la sangre o en la orina es difícil de controlar.
4. Antes de tener algún tratamiento médico o dental, cuidado de emergencia o cirugía dígame a su doctor que usted está tomando ésta medicina.
5. No tome otras medicinas sin hablar con su doctor.
6. Mantenga todas las medicinas fuera del alcance de los niños. Hasta una pequeña cantidad de ésta medicina puede enfermar a un niño o hasta causarle la muerte. Mantenga todas las medicinas en un lugar seguro donde los niños no puedan alcanzarlas.
7. Si está embarazada, planea embarazarse, o está dando pecho, dígame a su doctor **antes** de tomar ésta medicina. **Esta medicina puede tener efectos dañinos en los bebés sin nacer.** Si no está usando ningún anticonceptivo, asegúrese de decirle a su doctor.
8. Esta medicina puede cambiar la manera que trabajan las pastillas anticonceptivas y podría quedar embarazada. Pregunte a su doctor sobre otro método anticonceptivo.
9. **No comparta** esta medicina con nadie.
10. Asegúrese de **no faltar a sus citas** para consultar al doctor y para exámenes de sangre.
11. Dígame a su doctor si es **alérgico a alguna medicina.**
12. Todas las medicinas pueden causar efectos secundarios. Normalmente, estos efectos secundarios mejorarán después de unos cuantos días. Si no es así, debe decirle a su doctor. El doctor puede hacer algunos cambios en la medicina. **No deje** de tomar la medicina a menos que su doctor le diga. Los efectos secundarios **no quieren** decir que sea alérgico a la medicina.