

# *Su Medicina*

## **Carvedilol**

**(Coreg)**



IH-V-194S  
W.D. 10/01  
Pág. 1 de 2

### **Para qué necesito ésta medicina?**

El carvedilol se usa para disminuir la presión de la sangre. También se usa para tratar personas que tienen falla congestiva del corazón (CHF). Es un tipo de droga llamado bloqueador beta.

### **Cómo tomo esta medicina?**

- Tome esta medicina como se lo indique su médico. **No deje** de tomar ésta medicina a menos que su médico se lo indique.
- Tome esta medicina con alimentos y un vaso lleno de agua.
- Tome carvedilol todos los días a la misma hora.
- Si se le olvida una dosis, tómela apenas lo recuerde. Si es casi la hora para su próxima dosis, no se tome la que olvidó y regrese a su horario normal.
- **No** tome dos dosis al mismo tiempo.

### **Qué efectos secundarios puedo tener?**

- el latido del corazón es más lento de lo normal
- vómito
- mareo
- dificultad para dormir
- dolor de cabeza
- cansancio
- diarrea
- resequedad en los ojos

Si nota otros efectos secundarios, dígale a su médico.

**Llame a su proveedor de cuidados de salud o  
vaya a la sala de emergencia inmediatamente si:**

- le falta la respiración
- el latido del corazón es lento
- aumenta más de 2 libras por día
- tiene convulsiones
- se confunde
- se desmaya o siente mareo
- vomita

**(continúa)**

## Qué cosas especiales debo saber?

1. Asegúrese de que su proveedor de cuidados de salud y su dentista sepan que usted toma carvedilol.
2. Hable con su proveedor de cuidados de salud, o farmacéutico **antes** de tomar cualquier medicina que pueda comprar sin receta.
3. Dígale a su proveedor de cuidados de salud si es **alérgico a alguna medicina**.
4. Asegúrese de **cumplir sus citas** con el proveedor de cuidados de salud y los exámenes de sangre.
5. Pregúntele a su proveedor de cuidados de salud sobre el **consumo de alcohol** mientras toma carvedilol.
6. Estas medicinas pueden hacerle sentir cansado o soñoliento. Fíjese como se siente después de tomar la primera dosis. Si está mareado, levántese lentamente después de estar sentado o recostado. Si está mareado o soñoliento, **no** maneje ni haga otros trabajos en que necesite estar alerta.
7. **No** comparta esta medicina con nadie.
8. Mantenga toda la medicina fuera del alcance de los niños. Hasta una pequeña cantidad de medicina puede enfermar mucho a un niño o causarle la muerte. Mantenga todas las medicinas en un lugar seguro donde los niños no las puedan alcanzar.
9. Si está en embarazo, planea un embarazo, o está lactando, dígale a su proveedor de cuidados de salud **antes** de tomar la medicina. **Esta medicina puede tener efectos secundarios perjudiciales para los bebés aún no nacidos**. Si no está usando pastillas anticonceptivas, asegúrese de decirle a su proveedor de cuidados de salud.
10. Todas las medicinas pueden causar efectos secundarios. Generalmente, éstos desaparecen en pocos días. En caso contrario, debe hablar con su proveedor de cuidados de salud. El proveedor de cuidados de salud puede hacer cambios en la medicina. **No deje** de tomar las medicinas a menos que su proveedor de cuidados de salud se lo ordene. Los efectos secundarios **no** significan que usted sea alérgico a la medicina.