

Su Medicina



IH-V-196 S
W.D. 12/01
Pág. 1 de 2

Rho (D) Immune Globulin (Human) (RhoGAM)

Por qué necesito usar ésta medicina?

Esta medicina se le da para evitar que su cuerpo forme anticuerpos que pueden hacerle daño al bebé que espera, o a los que vengan más adelante.

Su cuerpo puede formar anticuerpos porque los glóbulos rojos no tienen el factor Rh, y los glóbulos rojos de su bebé tienen o pueden tener el factor Rh. El factor Rh es un antígeno (algo que hace que el cuerpo forme anticuerpos). Si su cuerpo forma anticuerpos, éstos pueden hacer daño a las células del bebé por nacer, lo cual puede hacer que el bebé se vuelva anémico. Por eso es importante que su cuerpo no produzca éstos anticuerpos.

Cómo y cuándo me dan ésta medicina?

- Esta medicina se da en forma de inyección cuando una mujer que es Rh negativo tiene 7 meses de embarazo.
- Se puede aplicar otra inyección después de que nace el bebé. Puede que necesite más de una inyección en ese momento, pero puede que no.
- Necesitará aplicarse una inyección de RhoGAM cada vez que quede en embarazo.
- También se le puede aplicar RhoGAM si la mujer Rh negativo en embarazo tiene:
 - amniocentesis (prueba para revisar el bebé en el útero).
 - un aborto no provocado o provocado.
 - un embarazo ectópico (en las trompas).
 - mucho sangrado vaginal en cualquier momento del embarazo.

(continúa)

Qué efectos secundarios puedo tener?

- Puede sentir un poco de dolor en el sitio de la inyección.
- Puede tener un poco de fiebre.

Si nota otros efectos secundarios, infórmele a su médico.

Dígale inmediatamente al proveedor del cuidado de su salud si tiene:

- salpullido (granitos rojos que dan comezón).
- opresión en el pecho y dificultad para respirar.
- náusea (se siente mal del estómago) o vómito.

Qué cosas especiales debo saber?

1. Asegúrese de decirle al proveedor del cuidado de su salud si antes ha tenido reacción a algunas vacunas.
2. Dígale al proveedor del cuidado de su salud si es **alérgica a alguna medicina**.
3. Asegúrese de **venir a todas sus citas**.
4. Durante los próximos 3 meses, antes de que la vacunen, dígale al profesional del cuidado de su salud que le han aplicado RhoGAM. Puede que RhoGAM evite que las vacunas funcionen como deben en su cuerpo.