

Su Medicamento

(Your Medication)

Enoxaparin

(Lovenox)



IH-V-197S
W. D. 9/02
Pág. 1 de 2

Por qué necesito esta medicina?

Esta medicina es un “anticoagulante” que ayuda a que la sangre no se coagule. Esta se la dan para evitar que se le formen coágulos en las venas grandes de sus piernas. Si se forman estos coágulos y corren por su torrente sanguíneo, pueden bloquear vasos sanguíneos más pequeños. Este bloqueo puede prevenir que la sangre vaya a algunas partes del cuerpo. A usted le pueden dar enoxaparin después de una cirugía o a veces por otros motivos.


Cómo tomo esta medicina?

- Mantenga esta medicina en un lugar seguro y seco donde no se caliente o enfríe demasiado. No la mantenga en el refrigerador.
- La dosis usual es dos veces al día entre 7 y 10 días. Se puede dar por más tiempo.
- Esta medicina es por medio de inyección. Su proveedor de salud puede ponerla. Usted puede aprender a ponérsela usted mismo, o que alguien más aprenda.
- La medicina tiene que ir por debajo de la piel (subcutánea), no en el músculo.
- Usted puede ponerse la inyección en la panza (pero no en el ombligo), su muslo, parte de arriba del brazo u otros lugares que le diga su proveedor de salud. Use un lugar distinto cada vez que se pone la inyección.

Lávese las manos antes de empezar.



- Limpie la piel con alcohol y algodón donde va a poner la inyección. Luego pellizque la piel, meta la aguja hasta adentro, y suelte la piel. Empuje la medicina.
- Saque la aguja y presione el algodón con alcohol en el lugar. **No lo frote.**
- Bote la aguja en un “recipiente para agujas”, **nunca** la bote a la basura.
- Si no se toma una dosis, tómela apenas se acuerde, Si es casi hora de la otra dosis, no se tome la que no se tomó y continúe con el horario normal. **No se tome dos dosis a la vez.**



(continúa)

Qué efectos secundarios puedo tener?

- sangrado
- dolor en el sitio de la inyección
- cosquilleo
- debilidad o adormecimiento
- fiebre
- náusea (sentirse mal del estómago)
- hinchazón
- dificultad para pensar
- dificultad para orinar

Si nota cualquier otro efecto secundario, avísele por favor a su doctor.

Vaya a la sala de emergencia de inmediato si:

- hay sangrado en cualquier parte del cuerpo
- tiene dificultad para respirar
- siente dolor donde le pusieron la inyección

Qué cosas especiales debo saber?

1. **Asegúrese que todos sus proveedores de salud y dentistas sepan que usted toma esta medicina.**
2. Hable con su proveedor de salud antes de tomar cualquier medicina que puede comprar sin receta.
3. Dígale a su proveedor de salud si es **alérgico a alguna medicina.**
4. Asegúrese de **mantener todas sus citas** para consultas y exámenes de sangre.
5. **No** comparta esta medicina con nadie.
6. Mantenga toda la medicina fuera del alcance de los niños. Aunque sea una pequeña cantidad, esta medicina puede enfermar mucho a su niño o causarle la muerte. Mantenga todas las medicinas en un lugar seguro donde los niños no las puedan alcanzar.
7. Si está en embarazo, si planea estar en embarazo, o está dando pecho, dígale a su doctor **antes** de tomar esta medicina. **Esta medicina puede tener efectos dañinos para bebés sin nacer.** Si no está usando pastillas anticonceptivas, asegúrese de decírselo a su proveedor de salud.
8. Todas las medicinas pueden causar efectos secundarios. Por lo general, estos efectos secundarios se mejorarán en un par de días. Si esto no sucede, debe decirle a su proveedor de salud. Puede que se hagan cambios en la medicina. **No deje** de tomar la medicina a menos que su proveedor de salud se lo diga. Los efectos secundarios **no** quieren decir que es alérgico a la medicina.