

# Su Medicina

## Metformin (Glucophage)



H-V-205S  
W.D. 1/07  
Pág. 1 de 2

### ¿Por qué necesito esta medicina?

Metformin se usa para controlar el azúcar en la sangre para las personas que tienen diabetes tipo 2. Funciona ayudando a que el cuerpo haga menos glucosa (azúcar) del hígado. No ayuda a que el cuerpo haga más insulina.

Si tiene problemas con sus **riñones, corazón, hígado y pulmones**, hágale saber a su profesional de salud antes de que empiece a tomar esta medicina.

### ¿Cómo tomo esta medicina?

- Tome esta medicina como le ha dicho su profesional de salud. **No** deje de tomar esta medicina a menos que su profesional de salud se lo diga.
- Tome esta medicina con alimentos.
- **No tome alcohol** mientras toma esta medicina a menos que su profesional de salud diga que está bien.
- Tome esta medicina a la misma hora aproximadamente todos los días.
- Si se toma una dosis, tómela tan pronto como se acuerde. Asegúrese de tomarla con alimentos. **No** tome dos dosis al mismo tiempo.
- Su profesional de salud puede querer que usted tome esta medicina junto con otras medicinas para la diabetes.
- Si tiene vómito, fiebre, y/o no puede mantener líquido en el cuerpo díglele a su profesional de salud **de inmediato**.



### ¿Qué efectos secundarios puedo tener?

- Dolor de cabeza
- Debilidad
- Náusea (sentirse mal del estómago) o vómito
- Gas y malestar de estómago
- Diarrea (mucho excremento aguado)
- Dolor en los músculos

Si nota algún otro efecto secundario, díglele a su profesional de salud.

(continúa)

## Llame a su proveedor de salud o vaya a la sala de emergencia de inmediato si:

- se siente débil
- se siente con más sueño de lo normal
- el latido del corazón está más lento de lo normal
- tiene dificultad para respirar
- tiene fiebre o escalofrío
- tiene dolor de músculos o cuerpo
- se siente mareado
- se desmaya



## ¿Qué cosas especiales necesito saber?

1. Dígale a su profesional de salud o dentista que está tomando esta medicina.
2. Dígale a su profesional de salud si es **alérgico a alguna medicina**.
3. Asegúrese de **mantener sus citas** con el profesional de salud y exámenes de sangre.
4. El tomar demasiado de esta medicina puede darle **acidosis láctica**. Las señales de este problema que es serio se mencionan arriba. Si tiene alguno de estos síntomas vaya a la **sala de emergencia**.
5. El tomar demasiado de esta medicina también puede **bajar el azúcar en la sangre**. Use productos que tienen glucosa como jugo de naranja, tabletas de glucosa B-D o Insta-Glucose Gel.
6. Dígale a su profesional de salud sobre **todas** las otras medicinas con receta, medicinas sin receta, vitaminas, suplementos y productos herbarios que puede estar tomando.
7. **No** comparta esta medicina con nadie. No permita que nadie más use su medicina.
8. Mantenga toda la medicina fuera del alcance de los niños. Hasta una pequeña cantidad de esta medicina puede enfermar a un niño hasta causarle la muerte. Mantenga todas las medicinas en un lugar seguro que los niños no puedan alcanzar.
9. Si está embarazada, planea estar embarazada, o está dando pecho, dígale a su profesional de salud **antes** de tomar esta medicina. **Esta medicina puede tener efectos dañinos en bebés que no han nacido**. Si no está usando pastillas anticonceptivas asegúrese de decirle a su doctor.
10. Todas las medicinas pueden causar efectos secundarios. Por lo general estos efectos secundarios mejorarán en pocos días. Si no es así debe decirle a su profesional de salud. Su profesional de salud puede hacer cambios en su medicina. **No** deje de tomar la medicina a menos que su profesional de salud se lo diga. El tener efectos secundarios **no** quiere decir que es alérgico a la medicina.